

Fåglar i Rocksjöområdet 2017 – sammanfattning



Arter

- Enstaka observationer: brun kärrhök (ev. häckning vid Tabergsåns utlopp), trastsångare, gräshoppsångare, rosenfink, storlom, vitkindad gås, aftonfalk (ej svensk häckfågel)
- Stare (VU) 2-3 revir
- Sävsparv (VU) 10 revir i vassen
- Backsvala (NT) – ej häckande, dock vid t ex Rosenlunds bankar.
- Snatterand – ovanlig, möjlig häckning
- Gråtrut (VU) – ej häckande, möjligen på angränsande hustak
- Gransångare – allt vanligare och har expanderat mycket de senaste 10 åren
- Sothöna och rörhöna – 10 häckningar och 4 revirhävdande honor av rörhöna

Jämförelse 2017 jämfört med 2005/6

- Nyetablering: morkulla, drillsnäppa, sothöna, rörhöna, taltrast, järnsparv, , entita, grönsångare, gransångare, gärdsmyg och ringduva
- Hålhäckande småfåglar som talgoxe, blåmes och svartvit flugsnappare har minskat
- Stark minskning: björktrast, koltrast, skata

- Vassområdesbundna rörsångaren har minskat till 3 revir från 27 medan sävsångare dubblerat från 8 till 17!
- Brun kärrhök, rosenfink, storskrake, rödstjärt, gök, kråka och mindre hackspett ej häckande

Slutsatser

- Fågelfaunan i Rocksjöområdet har utarmats något sedan 2006
- Avsaknaden av mindre hackspett som häckande fågelart indikerar att området blivit mer isolerat; för liten area av sumpskog
- Detta är bara ett år och kan bero på naturliga variationer – det var en kylslagen vår vilket var negativt för insekterna och en torr sommar med låga vattennivåer och t o m torra våtmarksområden
- Inventeringen 2005/6 gjordes av många olika personer vilket kan ha betydelse i jämförelsen
- Viktigt att habitatet inte minskar – skötsel nödvändig genom hävd, vasslåtter, ev. tillskapande av död ved
- Bygg fler häckningsflottar vilket är positivt framför allt för tärnor och måsar