

ÖVRIGA INDIKATORER

Alkohol och tobak


Behörighet att läsa vidare till
nationellt program i gymnasiet

Tandhälsa

Amning

Spädbarn och rökning

HÖGSTADIESKOLORNAS UPPTAGNINGSSOMRÅDEN



I Jönköpings kommun finns det nio skolupptagningsområden för högstadieskolor. Ett av dessa (Rosenlundsskolan) är uppdelat på två områden.

Indelningen i högstadiernas skolupptagningsområden används vid redovisning av alkohol och tobak samt behörighet att läsa vidare till nationellt gymnasieprogram.

ALKOHOL OCH TOBAK I ÅRSKURS 9 2008

Redovisningen bygger på den ANT-undersökning (ANT = alkohol, narkotika, tobak) som Jönköpings kommun varje år genomför i samtliga klasser i högstadiet. I undersökningen ingår de nio kommunala högstadieskolorna. Även riksinternatet Grenna-skolan och friskolan Strandskolan ingår i genomsnittet för Jönköpings kommun, men på grund av litet elevantal särredovisas inga uppgifter för dessa två skolor. Nedan redovisas resultatet för årskurs 9 från höstterminen 2008. Generellt ökar både andelen rökare och andelen som dricker alkohol successivt från årskurs 7 till årskurs 9.

I Jönköpings kommun röker i genomsnitt 21% av eleverna i årskurs 9, 22% av flickorna och 20% av pojkarna. Normalt är andelen rökare högre bland flickor än pojkar, men under de senaste åren har avståndet mellan dem minskat. Motsvarande genomsnitt för hela riket 2008 är 25%, 28% av flickorna och 22% av pojkarna.

Andelen som använder snus är 9%, 14% av pojkarna och 4% av flickorna. I riket är motsvarande uppgifter desamma för flickorna och 16% för pojkarna.

Andelen elever som någon gång under året har druckit alkohol är i genomsnitt 50%, något större andel flickor som pojkar. Variationen är stor mellan de olika högstadieskolorna. Genomsnittet för riket är betydligt högre, där 64% har druckit alkohol någon gång under 2008.


Alkohol- och tobaksanvändning i Jönköpings kommun 2008 fördelad efter kön

	pojkar	flickor	totalt
Andel som röker i årskurs 9 2008	20%	22%	21%
Andel som någon gång har druckit alkohol det senaste året i årskurs 9 2008	48%	52%	50%
Andel som dricker alkohol varje vecka	8%	8%	8%
Andel som använder snus i årskurs 9 2008	14%	4%	9%


Alkohol- och tobaksanvändning 2008 fördelad efter skola

Skola	Andel rökare	Andel som har druckit alkohol det senaste året
Attarpsskolan	19%	50%
Ribbaskolan	25%	57%
Kungsängsskolan	15%	34%
Junedalsskolan	20%	47%
Alfred Dalinsskolan	26%	53%
Rosenlundsskolan	24%	57%
Flahultsskolan	20%	66%
Stadsgårdsskolan	10%	39%
Ljungarumsskolan	25%	46%
Jönköpings kommun	21%	50%
Riket 2008	25%	64%

Andel rökare i årskurs 9 i Jönköpings kommun 2008



Andel som dricker alkohol i årskurs 9 i Jönköpings kommun 2008




BEHÖRIGHET I ÅRSKURS 9 ATT LÄSA VIDARE TILL NATIONELLT GYMNASIEPROGRAM VT 2008

Med behörighet att läsa vidare till ett nationellt gymnasieprogram menas att eleverna skall vara godkända i ämnena svenska, engelska och matematik i årskurs 9 i högstadiet. Inför höstterminen 2008 var det sammanlagt 11% av Jönköpings kommuns elever i årskurs 9 som inte var behöriga att läsa vidare på gymnasiet.

Andelen som har uppnått de nationella målen varierar mellan de olika ämnena. I engelska och svenska är det i genomsnitt knappt 5 respektive 3% som inte har uppnått målen medan det i matematik är nästan 8%. Fördelningen mellan ämnena varierar mellan de olika högstadieskolorna, men oftast är det matematik som har högst andel icke behöriga.

I diagrammet nedan redovisas samtliga kommunala högstadieskolor samt de fristående skolorna Grennaskolan, Prolympia och Jönköpings kristna skola. De fristående skolorna är inte knutna till några specifika upptagningsområden och deras resultat ingår inte heller i genomsnittet för Jönköpings kommun. Ytterligare några fristående skolor finns i kommunen, men dessa särredovisas inte på grund av litet elevantal.

Andel behöriga till gymnasieskolans nationella program vt 2008



TANDVÅRDSOMRÅDEN



Jönköpings kommun är indelad i nio tandvårdsområden. Ett av dessa är uppdelat i två delar (Rosenlund). Indelningen används för redovisning av tandhälsa, uppdelat på kariesfria 12- respektive 19-åringar.

Tenhult saknar data för år 2008 och redovisas därför inte.


TANDHÄLSA

Tandhälsa redovisas som andel kariesfria 12- och 19-åringar inom varje tandvårdsområde. Under 2008 var i genomsnitt 74% av 12-åringarna och 38% av 19-åringarna kariesfria i Jönköpings kommun. Motsvarande uppgifter för hela riket är 72% respektive 21%.

Andelen kariesfria 12-åringar varierar från drygt 80% i tandvårdsområdena Hälsan och Norrahammar till 65% i Öxnehaga. Bland 19-åringarna är spannvidden större, där varierar andelen kariesfria från 30% i Råslätt och Öxnehaga till 53% i Norrahammar.

Ett visst samband finns mellan kariesfrekvensen hos 12-åringar och 19-åringar. Där kariesfrekvensen är låg hos 12-åringarna är den oftast också låg hos 19-åringarna och tvärtom.

Andel kariesfria 12- och 19-åringar i olika tandvårdsområden 2008



PRIMÄRVÅRDSOMRÅDEN



Jönköpings kommun är indelad i åtta primärvårdsområden. Indelningen används för redovisning av amning samt spädbarn och rökning.

AMNING

Nyblivna mammor rekommenderas att, om möjligt, amma sitt barn tills det är cirka sex månader.


I diagrammet nedan redovisas för varje primärvårdsområde i Jönköpings kommun hur stor andel av mammorna som ammar sina barn helt vid fyra respektive 6 månaders ålder. Uppgifterna är hämtade från Landstinget och avser barn födda under 2006.

I Jönköpings kommun är det 62% av de nyblivna mammorna som ammar sina barn helt vid fyra månaders ålder. När barnen är sex månader har andelen sjunkit kraftigt till knappt 21%. Motsvarande uppgifter för riket är 60 respektive 15%.

Störst andel som ammar helt vid fyra månader finns i Huskvarna och Bankeryds primärvårdsområden, där andelen ligger strax under 70%. Lägst är amningsfrekvensen i Öxnehaga med cirka 50%.

När barnen är sex månader är andelen mammor som ammar helt störst i Huskvarna med cirka 40%. Lägst andel har Råslätt och Öxnehaga med 7-8%.

Andel nyblivna mammor som ammar helt när barnet är 4 respektive 6 månader



SPÄDBARN OCH RÖKNING

Tobaksrök påverkar kroppens immunförsvar och skadar slemhinnorna i luftvägarna. Små barn är särskilt känsliga. Barn som utsätts för tobaksrök får fler luftvägsinfektioner, fler öroninflammationer och behöver oftare sjukhusvård än andra barn. Studier har också visat att risken för plötslig spädbarnsdöd ökar om barnet utsätts för tobaksrök.

I diagrammet nedan redovisas för varje primärvårdsområde i Jönköpings kommun hur stor andel av mödrarna respektive andel av fäderna som röker när barnet är 0 – 4 veckor gammalt. Barnen är födda under 2006.

Lägst andel rökande mödrar med barn i åldern 0 – 4 veckor finns i Bankeryds och Hälsans primärvårdsområden, 2 respektive 3 %. Högst är andelen i Rosenlund och Råslätt med cirka 6%. Genomsnittet i Jönköpings kommun är drygt 4%. Motsvarande uppgift för riket där barnen är födda 2007 är 6%.

Andelen rökande fäder är i allmänhet större än andelen rökande mödrar. Undantag är Bankeryds primärvårdsområde, där andelen endast är knappt 2% och i Gränna där inga fäder röker. Störst är andelen i Öxnehaga med drygt 21% och därefter kommer Råslätt med 15%. Genomsnittet för Jönköpings kommun är 9%, och för riket 11% (2007).

Andel rökande mödrar och fäder när barnet är 0 – 4 veckor gammalt

